



AB-Dentál Fogorvosi és Szájsebészeti Kft.
7624 Pécs, Hungária út 53/1, Tel.: +36-72-213507
7815 Harkány, Szent István u 57. Tel.: +36-72-479978
e-mail: balazs.nagy@ab-dental.hu, aniko.voros@ab-dental.hu
www.ab-dental.hu

Tájékoztató bölcsességfog eltávolításáról

Kedves Páciensünk!

Vizsgálataink alapján az Ön bölcsességfoga számára nem áll rendelkezésre elegendő hely, hogy előtörjön, ezért az érintett fog eltávolítását ajánljuk a következők miatt:

- gyulladás megakadályozása érdekében, amely gócbetegségekhez is vezethet
- ciszta kialakulásának megelőzése miatt
- a szomszédos fogak károsodásának megelőzése érdekében
- a fogsor torzulásának, harapási rendellenesség megelőzése érdekében
- fogpótlások készítése előtt, későbbi szövődmények elkerülése miatt

Műtét:

A műtétet helyi érzéstelenítésben végezzük. A műtét alatt nyomásérzékenység előfordul. A műtétet követően arcduzzanat, szájnyitási, nyelési korlátozottság, fájdalom, hőemelkedés jelentkezik, ezek a panaszok néhány nap alatt fokozatosan megszűnnek.

A műtétet követően:

- Nem szabad öblögetni, szívoogatni és a nyelvvel érinteni a műtégi sebet!
- A műtégi területet kívülről jégelje, óránként 10-15 percig, majd szünetet tartva!
- Tartózkodjon a testi megerőltetéstől! (ne hajolgasson, ne emeljen)
- A műtégi napot követően a seb környékét óvatosan tisztítsa!
- Lehetőleg kerülje az alkohol, kávé, tej és tejes termékek valamint apró magvas ételek fogyasztását!

Kérjük, hogy esetleges utóvérzésről, erőteljes duzzanat kialakulásáról, magas lázról, erős fájdalomról vagy más, az Ön általános állapotát érintő - a műtétet követően kialakult - panaszáról értesítse kezelőorvosát.

Lehetséges szövődmények:

Mint minden orvosi beavatkozásnak, a bölcsességfogeltávolításának is lehetnek szövődményei. Ilyen szövődmény lehet például felső bölcsességfog eltávolítása után sipoly kialakulása az arcüreg és a szájüreg között. A sebet ilyenkor lezárjuk. Tüsszentés, orrfújás ilyen esetben 6 hétig tilos. Alsó bölcsességfogak eltávolításakor pedig előfordulhat az alsó ajakfél átmeneti vagy végleges zsibbadása, amely érzéskiesést a bölcsességfog gyökércsúcsának közvetlen közelében futó ideg nyomás alá kerülése vagy esetleges sérülése okoz.

Ritka szövődmény az állcsont törése, mely eredményesen kezelhető. Minden műtégi beavatkozást követően felléphetnek utóvérzések, sebgyógyulási zavarok, gyulladással járó panaszok, a gyakorlatban azonban nem kell további szövődményektől tartani.

A műtét után szükség szerint gyógyszerek kiváltásához recepttel ellátjuk.