



AB-Dentál Fogorvosi és Szájsebészeti Kft.
7624 Pécs, Hungária út 53/1, Tel.: +36-72-213507
7815 Harkány, Szent István u 57. Tel.: +36-72-479978
e-mail: balazs.nagy@ab-dental.hu, aniko.voros@ab-dental.hu
www.ab-dental.hu

Tájékoztató gyökércsúcs-rezekcióról

Kedves Páciensünk!

Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy a vizsgált fog megtartása érdekében ún. gyökércsúcs-rezekciót kell végezni gyulladás illetve cisztaképződés miatt. A beavatkozás teljes biztonsággal nem garantálja az érintett fog megmaradását.

Műtét:

A műtét során helyi érzéstelenítést alkalmazva rezekciót, azaz a gyökércsúcs 2-3 mm-ének eltávolítását végezzük el, majd a környező gyulladásos szövetekkel, cystozus képletekkel együtt. A sebet varrattal zárjuk, amit, a műtét után egy héttel el kell távolítani. A műtét miatt átmeneti arcduzzanat, fájdalom, véraláfutás léphet fel. 3-6 hónap után röntgen kontrollt végzünk a gyógyulási folyamatok leellenőrzése miatt.

A műtétet követően:

- Nem szabad öblögetni, szívogatni és a nyelvvel érinteni a műtégi sebet!
- A műtégi területet kívülről jegelje!
- Tartózkodjon a testi megerőltetéstől! (ne hajolgasson, ne emeljen)
- A műtégi napot követően a seb környékét óvatosan tisztítsa!
- Lehetőleg kerülje az alkoholt, kávé, tej és tejes termékek valamint apró magvas ételek fogyasztását!

Kérjük, hogy az esetleges utóvérzésről, erőteljes duzzanat kialakulásáról, magas lázról, erős fájdalomról vagy más, az Ön általános állapotát érintő - a műtétet követően kialakult - panaszáról értesítse kezelőorvosát.

Lehetséges szövődmények:

Mint minden orvosi beavatkozásnak, a gyökércsúcs-rezekciónak is lehetnek szövődményei. Ilyen szövődmény lehet az orrüreg vagy az arcüreg megnyílása esetleg az állcsontban haladó ideg sérülése. Minden műtét után felléphetnek utóvérzések, sebgyógyulási zavarok, gyulladásos panaszok, a gyakorlatban azonban nem kell további szövődményektől tartani.

A műtét után szükség szerint gyógyszerek kiváltásához recepttel ellátjuk.